

農林水産省登録  
第23278号

芝生・樹木用殺虫剤

シンジェンタ



# アセルプリン®

®はシンジェンタ社の登録商標です。

支える。

チョウ目への高い効果と長期残効性で  
芝生・樹木の効率的な害虫防除を実現します。

シンジェンタ  
アセルプリン®

syngenta®

TM

# 芝生・樹木用殺虫剤 シンジェンタ アセルプリン®

- ◇ 農林水産省登録 第23278号
- ◇ 包装：100ml×6本入
- ◇ 成分：クロラントラニプロール……………18.4%  
水、界面活性剤等……………81.6%
- ◇ 人畜毒性・毒物及び劇物取締法：非該当

## ■ 特長

- ◇ 優れた長期残効性を示すため、薬剤散布の手間を軽減することができます。
- ◇ チョウ目に対し高い効果を示しますので、コース内の効率的な芝生・樹木害虫対策にお役立ていただけます。
- ◇ 芝や人畜への安全性が高いため、安心してお使いいただけます。

## ■ 適用病害虫名の範囲および使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
芝	スジキリヨトウ	20mL/10a	200L/10a	発生前～発生初期	2回以内	散布	2回以内
	シバツトガ	30mL/10a	50～300L/10a				
	タマナヤガ						
	コガネムシ類幼虫	50mL/10a	500L/10a				
		100mL/10a	200～1000L/10a				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数
樹木類	ケムシ類	10000～20000倍	200～700L/10a	発生前～発生初期	2回以内	散布	2回以内

2013年8月現在

## ■ 効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用は避けてください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

## ■ 安全使用上の注意

- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

ローン アンド ガーデン事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階

TEL:03-6221-3802 FAX:03-6221-3899

http://www.syngenta.co.jp/golf

取扱い