



パノラマ[®] フロアブル

殺菌剤 芝用

特 長

- 抗菌スペクトラムが広く、浸透移行性に優れたDMI剤
- 雪腐小粒菌核病に対し、根雪前の散布で長期間安定した効果
- グラースポット病に対し、高い防除効果
- 薬剤調製のしやすいフロアブル製剤

株式会社 曙通商

〒003-0027 北海道札幌市白石区本通 14 丁目北 5 番 35 号
TEL.011-867-8080 FAX.011-867-8081

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	雪腐小粒菌核病	500 ~ 800 倍	0.2ℓ /㎡	根雪前	3回以内	散 布	6回以内
西洋芝 (ブルーグラス)			1,000倍				
	ガラスポット病	2,000倍	0.5ℓ /㎡	発病初期	6回以内		

有効成分と性状

種 類	テブコナゾール水和剤
商 品 名	パノラマフロアブル
有効成分	テブコナゾール 40.0%
性 状	類白色水和性粘稠懸濁液体
有効年限	3年
荷 姿	500ml × 20本

人畜・魚介類に対する安全性 (製剤)

急性毒性	ラット (♂♀)	LD ₅₀ > 2,000mg/kg (経口)
	ラット (♂♀)	LD ₅₀ > 2,000mg/kg (経皮)
生態毒性	コイ	LD ₅₀ 19.3mg/ℓ (96時間)
	オオミジンコ	EC ₅₀ 9.9mg/ℓ (48時間)
	藻 類	ErC ₅₀ 11.34mg/ℓ (0-72時間)

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用前に容器をよく振ってください。
- はくさい、だいこんにはかからないようにしてください。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特にはじめに使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 貯蔵上の注意事項

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。
- 空容器は圃場に放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。
 - 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをして、衣服を換えてください。
 - 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 魚毒性…通常の使用方法では問題はありません。
保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。

■ 空容器は圃場に放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。

雪腐小粒菌核病に対する効果 10月処理／根雪前



試験場所	処理日	調査日	散布水量	区制・面積
北海道Aゴルフ場	2013年10月29日	2014年4月15日 (168日後)	0.2ℓ /㎡	4㎡/区(社内試験)