



ラージパッチ・春はげ症をはじめ、
幅広い病害を同時に防除！



クルセイダー[®] フロアブル

殺菌剤

芝用

幅広い病害防除効果

散布面積の大きいフェアウェイ・ラフでも、一発で防除が可能です。
特に、難防除の外着性根部感染症のひとつである立枯病（ゾイシア
ディクライン）にも高い効果を示します。

芝生への影響が少ないため、安心して使用できます。

®はバイエルグループの登録商標



ラージパッチを中心に多くの日本芝の病害に効果があります。



ラージパッチ



春はげ症



さび病



ゾイシアディクライン



カーブラリア葉枯病



象の足跡

● 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む 農業の総使用回数
日本芝	カーブラリア葉枯病	1,000	発病初期	6回以内	1㎡当たり0.25ℓ散布	6回以内
		2,000			1㎡当たり0.5ℓ散布	
	葉腐病(ラージパッチ)	400			1㎡当たり0.1ℓ散布	
	さび病	1,000			1㎡当たり0.25ℓ散布	
	疑似葉腐病(象の足跡)					
	立枯病(ゾイシアディクライン)	1,000			1㎡当たり0.5ℓ散布	
	2,000	1㎡当たり0.2~0.25ℓ散布				
疑似葉腐病(春はげ症)	1,000	休眠期前	1㎡当たり0.5ℓ散布			
2,000						
西洋芝 (ブルーグラス)	ダラースポット病	1,000	発病初期	6回以内	1㎡当たり0.25ℓ散布	6回以内
		2,000			1㎡当たり0.5ℓ散布	

成分：テブコナゾール…40.0% 魚毒性等：コイLC50 19.3mg/ℓ(96h)
 種類名：テブコナゾール水和剤 オオミジンコEC50 9.9mg/ℓ(48h)
 性状：類白色水和性粘稠懸濁液体 藻類ErC50 11.3mg/ℓ(0-72h)

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用前に容器をよく振ってください。
- はくさい、だいこんにはかからないようにしてください。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に始めて使用する場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 散布時は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをして、衣服を換えてください。
- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。魚毒性等…通常の使用方法では問題はありません。
- 保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。
- 空容器は圃場に放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。

荷姿 / 500ml × 10本

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

バイエル クロップサイエンス株式会社
 エンバイロサイエンス事業本部
 〒100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5
 【お客様相談室】0120-575-078
 www.es.bayer.jp

お問い合わせ先

PROTECTING TOMORROW ...TODAY

バイエルクロップサイエンスでは、
 将来の世代のニーズを損なうことなく、
 現代のニーズを満たす、「持続可能な発展」のため、
 Protecting Tomorrow ... Todayをモットーに
 様々な活動を実施しています。

