

新系統

芝生用殺虫剤

農林水産省登録
第22269号

ステインガー®

フロアブル

鱗翅目(チョウ目)害虫を逃がさない!!

全く新しい作用性なので、グリーン等のローテーション散布の
基幹剤として!!

鱗翅目害虫(シバツトガ、タマナヤガ、スジキリヨトウ)に対して、
類を見ない残効性があるので、ラフ・FWの除草剤、殺菌剤散布時の
タンクミックスに!!



シバツトガ



タマナヤガ



スジキリヨトウ

特長

1. 幅広い鱗翅目害虫に優れた効果を発揮する全く新しいタイプの殺虫剤です
2. 速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します
3. 優れた効果持続性があり、散布後、長期間にわたって安定した効果を示します
4. 新しい作用機作を有するので、従来の殺虫剤の影響による抵抗性害虫にも有効です
5. オサムシ、ハサミムシなど芝害虫を捕食する天敵に対する影響は少ないです

ステインガーフロアブルは日本農薬(株)が発明した新規作用機作を有するベンゼンジカルボキサミド系フルベンジアミドを有効成分とする芝生用殺虫剤です。



株式
会社



トモグリーンケミカル

スティンガー®

フロアブル

作用メカニズム

スティンガーフロアブルの有効成分「フルベンジアミド」は、害虫の筋肉伸縮活動に影響を及ぼし、本剤を摂食活動により体内に取り込んだ害虫は、筋肉が収縮し、速やかに摂食活動が停止し、餓死に至ります。



餌を食べられず
体が縮んで餓死
してしまう

左の写真は、ゴルフ場のラフで本剤を処理した2日後の調査で、本剤の影響でアコーディオン状に収縮したスジキリヨトウ老齢幼虫

適用害虫と使用方法

包装：100ml × 8本 (16,000㎡/ケース)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む 農薬の総使用回数
芝	シバツトガ タマナヤガ スジキリヨトウ	4,000	発生初期	2回以内	1㎡当り 200ml散布	2回以内



効果・薬害等の注意

- ・蚕に対しては長期間毒性があるので、桑葉には絶対かからないように散布してください。
- ・本剤の使用に当たっては、使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所など関係機関の指導を受けるようにしてください。



安全使用上の注意

- ・本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。
- ・眼に入った場合は直ちに水洗してください。
- ・使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ・公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

® 日本農薬登録商標

・使用前にラベルをよく読んでください。 ・ラベルの記載以外は使用しないでください。 ・本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ・使用後の空容器は圃場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。

取扱店



－ 芝害虫究明と共に －
株式会社 **トモグリーン・ケイカル**

〒420-0816 静岡市葵区沓谷五丁目9番地の12
TEL <054>264-2151 FAX 264-2153
ホームページ <http://www.tomo-green.com/>

31208N