



芝生用殺菌・除草剤

モノドクター フロアブル

®は丸和バイオケミカルの登録商標です。

ジラム…40%

包装 / 2ℓ×6本入

藻類生育期(発生初期～生育盛期)に
シャープな効果

かさ枯病(細菌病)、炭疽病の同時防除も可能!!

フロアブル化により、使用量が変更になっておりますのでご注意ください。

フロアブルになって

適用拡大

新登場

かさ枯病
(細菌病)



モノドクター水和剤の使用量×約1.6倍が
モノドクターフロアブルの使用量になります。

モノドクター水和剤、フロアブル薬量換算表

モノドクター水和剤	モノドクターフロアブル
約 1.24g 相当(適用外)	2.0mℓ
約 1.86g 相当(適用外)	3.0mℓ
約 2.48g 相当	4.0mℓ


適用病害・適用雑草と使用方法

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	ジラムを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量			
西洋芝 (ベント グラス)	炭疽病	発病初期	3~4ml/m ²	200ml/m ²	8回以内	散布	8回以内
	かさ枯病						
	藻類	芝生育期 (藻類生育期)	2~4ml/m ²				

！ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 石灰硫黄合剤及びボルドー液との混用はさけてください。また、無機銅を含む剤との混用及び近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 夏期高温時に連用散布すると薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 液肥類、特にアルカリ性の葉面散布液肥との併用は、軽微な葉色の変化を生じる場合があるので注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

！ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
-  散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。

魚毒性等… 水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管… 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

● 使用前にラベルをよく読む。 ● ラベルの記載以外には使用しない。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かない。

■ お求めは…

■ 販売元

 **丸和バイオケミカル株式会社**
ユニカス事業部

■ 本社 / 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
☎03-5296-2340 <http://www.mbc-g.co.jp>
■ 札幌 / ☎011-222-2305 ■ 仙台 / ☎022-261-1319
■ 名古屋 / ☎052-951-7235 ■ 大阪 / ☎06-6484-7222
■ 福岡 / ☎092-712-8330

お問い合わせ窓口 / ☎03-5962-9731(平日9:00~17:00 祝祭日を除く)

ユニカスは日本ジュニアゴルファー育成協議会(JGC)を応援しています。